

Derivadas Parciais de Ordem Superior

Luis Alberto D'Afonseca

Cálculo de Funções de Várias Variáveis – I



<https://material-didatico.github.io/pages/cfvv1>

Conteúdo

Derivadas Parciais de Segunda Ordem

Teorema das Derivadas Mistas

Derivadas Parciais de Ordem Superior

Lista Mínima

Conceito

Derivada de uma derivada de uma função

Derivadas de segunda ordem

Notações

Derivadas de segunda ordem

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

$$f_{xx}$$

Notações

Derivadas de segunda ordem

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

$$f_{xx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

$$f_{yy}$$

Notações

Derivadas de segunda ordem

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

$$f_{xx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

$$f_{yy}$$

Derivadas de segunda ordem mistas

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

$$f_{yx}$$

Notações

Derivadas de segunda ordem

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

$$f_{xx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

$$f_{yy}$$

Derivadas de segunda ordem mistas

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

$$f_{yx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

$$f_{xy}$$

Atenção Para a Ordem das Derivadas Mistas

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

Atenção Para a Ordem das Derivadas Mistas

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

Atenção Para a Ordem das Derivadas Mistas

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$f_{xy}(x, y)$$

Atenção Para a Ordem das Derivadas Mistas

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$f_{xy}(x, y) = \left(f_x(x, y) \right)_y$$

Exemplo 1

Encontre as derivadas de segunda ordem da função

$$f(x, y) = x \cos(y) + ye^x$$

Exemplo 1

Encontre as derivadas de segunda ordem da função

$$f(x, y) = x \cos(y) + ye^x$$

Note que f é contínua no plano

Exemplo 1

Encontre as derivadas de segunda ordem da função

$$f(x, y) = x \cos(y) + ye^x$$

Note que f é contínua no plano

Precisamos calcular f_{xx} , f_{yy} , f_{xy} e f_{yx}

Exemplo 1 – f_x

$$f_x(x, y)$$

Exemplo 1 – f_x

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}$$

Exemplo 1 – f_x

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y) + ye^x) \end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_x

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y) + ye^x) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y)) + \frac{\partial}{\partial x} (ye^x) \end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_x

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y) + ye^x) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y)) + \frac{\partial}{\partial x} (ye^x) \\ &= \cos(y) \frac{\partial x}{\partial x} + y \frac{\partial e^x}{\partial x} \end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_x

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x} \\&= \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y) + ye^x) \\&= \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y)) + \frac{\partial}{\partial x} (ye^x) \\&= \cos(y) \frac{\partial x}{\partial x} + y \frac{\partial e^x}{\partial x} \\&= \cos(y) + ye^x\end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_x

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x} \\&= \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y) + ye^x) \\&= \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y)) + \frac{\partial}{\partial x} (ye^x) \\&= \cos(y) \frac{\partial x}{\partial x} + y \frac{\partial e^x}{\partial x} \\&= \cos(y) + ye^x\end{aligned}$$

(contínua no plano)

Exemplo 1 – f_y

$$f_y(x, y)$$

Exemplo 1 – f_y

$$f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}$$

Exemplo 1 – f_y

$$\begin{aligned} f_y(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial y} \\ &= \frac{\partial}{\partial y} (x \cos(y) + ye^x) \end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_y

$$\begin{aligned} f_y(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial y} \\ &= \frac{\partial}{\partial y} (x \cos(y) + ye^x) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} (x \cos(y)) + \frac{\partial}{\partial y} (ye^x) \end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_y

$$\begin{aligned}f_y(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial y} \\&= \frac{\partial}{\partial y}(x \cos(y) + ye^x) \\&= \frac{\partial}{\partial y}(x \cos(y)) + \frac{\partial}{\partial y}(ye^x) \\&= x \frac{\partial}{\partial y} \cos(y) + e^x \frac{\partial y}{\partial y}\end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_y

$$\begin{aligned}f_y(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial y} \\&= \frac{\partial}{\partial y}(x \cos(y) + ye^x) \\&= \frac{\partial}{\partial y}(x \cos(y)) + \frac{\partial}{\partial y}(ye^x) \\&= x \frac{\partial}{\partial y} \cos(y) + e^x \frac{\partial y}{\partial y} \\&= -x \sin(y) + e^x\end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_y

$$\begin{aligned}f_y(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial y} \\&= \frac{\partial}{\partial y}(x \cos(y) + ye^x) \\&= \frac{\partial}{\partial y}(x \cos(y)) + \frac{\partial}{\partial y}(ye^x) \\&= x \frac{\partial}{\partial y} \cos(y) + e^x \frac{\partial y}{\partial y} \\&= -x \sin(y) + e^x \\&= e^x - x \sin(y)\end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_y

$$\begin{aligned}f_y(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial y} \\&= \frac{\partial}{\partial y}(x \cos(y) + ye^x) \\&= \frac{\partial}{\partial y}(x \cos(y)) + \frac{\partial}{\partial y}(ye^x) \\&= x \frac{\partial}{\partial y} \cos(y) + e^x \frac{\partial y}{\partial y} \\&= -x \sin(y) + e^x \\&= e^x - x \sin(y)\end{aligned}$$

(contínua no plano)

Exemplo 1 – f_{xx}

$$f_{xx}(x, y)$$

Exemplo 1 – f_{xx}

$$f_{xx}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

Exemplo 1 – f_{xx}

$$\begin{aligned} f_{xx}(x, y) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{xx}

$$\begin{aligned} f_{xx}(x, y) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (\cos(y) + ye^x) \end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{xx}

$$\begin{aligned} f_{xx}(x, y) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (\cos(y) + ye^x) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (\cos(y)) + \frac{\partial}{\partial x} (ye^x) \end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{xx}

$$\begin{aligned}f_{xx}(x, y) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial x} (\cos(y) + ye^x) \\&= \frac{\partial}{\partial x} (\cos(y)) + \frac{\partial}{\partial x} (ye^x) \\&= 0 + y \frac{\partial e^x}{\partial x}\end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{xx}

$$\begin{aligned}f_{xx}(x, y) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial x} (\cos(y) + ye^x) \\&= \frac{\partial}{\partial x} (\cos(y)) + \frac{\partial}{\partial x} (ye^x) \\&= 0 + y \frac{\partial e^x}{\partial x} \\&= ye^x\end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{xx}

$$\begin{aligned}f_{xx}(x, y) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial x} (\cos(y) + ye^x) \\&= \frac{\partial}{\partial x} (\cos(y)) + \frac{\partial}{\partial x} (ye^x) \\&= 0 + y \frac{\partial e^x}{\partial x} \\&= ye^x\end{aligned}$$

(contínua no plano)

Exemplo 1 – f_{xy}

$$f_{xy}(x, y)$$

Exemplo 1 – f_{xy}

$$f_{xy}(x, y) = (f_x)_y(x, y)$$

Exemplo 1 – f_{xy}

$$\begin{aligned} f_{xy}(x, y) &= (f_x)_y(x, y) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{xy}

$$\begin{aligned} f_{xy}(x, y) &= (f_x)_y(x, y) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} (\cos(y) + ye^x) \end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{xy}

$$\begin{aligned}f_{xy}(x, y) &= (f_x)_y(x, y) \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial y} (\cos(y) + ye^x) \\&= \frac{\partial}{\partial y} (\cos(y)) + \frac{\partial}{\partial y} (ye^x)\end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{xy}

$$\begin{aligned}f_{xy}(x, y) &= (f_x)_y(x, y) \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial y} (\cos(y) + ye^x) \\&= \frac{\partial}{\partial y} (\cos(y)) + \frac{\partial}{\partial y} (ye^x) \\&= -\operatorname{sen}(y) + e^x \frac{\partial y}{\partial y}\end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{xy}

$$\begin{aligned}f_{xy}(x, y) &= (f_x)_y(x, y) \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial y} (\cos(y) + ye^x) \\&= \frac{\partial}{\partial y} (\cos(y)) + \frac{\partial}{\partial y} (ye^x) \\&= -\operatorname{sen}(y) + e^x \frac{\partial y}{\partial y} \\&= -\operatorname{sen}(y) + e^x\end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{xy}

$$\begin{aligned}f_{xy}(x, y) &= (f_x)_y(x, y) \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial y} (\cos(y) + ye^x) \\&= \frac{\partial}{\partial y} (\cos(y)) + \frac{\partial}{\partial y} (ye^x) \\&= -\operatorname{sen}(y) + e^x \frac{\partial y}{\partial y} \\&= -\operatorname{sen}(y) + e^x = e^x - \operatorname{sen}(y)\end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{xy}

$$\begin{aligned}f_{xy}(x, y) &= (f_x)_y(x, y) \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial y} (\cos(y) + ye^x) \\&= \frac{\partial}{\partial y} (\cos(y)) + \frac{\partial}{\partial y} (ye^x) \\&= -\operatorname{sen}(y) + e^x \frac{\partial y}{\partial y} \\&= -\operatorname{sen}(y) + e^x = e^x - \operatorname{sen}(y) \quad (\text{contínua no plano})\end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{yy}

$$f_{yy}(x, y)$$

Exemplo 1 – f_{yy}

$$f_{yy}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Exemplo 1 – f_{yy}

$$\begin{aligned} f_{yy}(x, y) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \\ &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{yy}

$$\begin{aligned}f_{yy}(x, y) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial y} (e^x - x \operatorname{sen}(y))\end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{yy}

$$\begin{aligned}f_{yy}(x, y) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial y} (e^x - x \sin(y)) \\&= \frac{\partial}{\partial y} (e^x) - \frac{\partial}{\partial y} (x \sin(y))\end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{yy}

$$\begin{aligned}f_{yy}(x, y) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial y} (e^x - x \operatorname{sen}(y)) \\&= \frac{\partial}{\partial y} (e^x) - \frac{\partial}{\partial y} (x \operatorname{sen}(y)) \\&= 0 - x \frac{\partial}{\partial y} \operatorname{sen}(y)\end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{yy}

$$\begin{aligned}f_{yy}(x, y) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial y} (e^x - x \operatorname{sen}(y)) \\&= \frac{\partial}{\partial y} (e^x) - \frac{\partial}{\partial y} (x \operatorname{sen}(y)) \\&= 0 - x \frac{\partial}{\partial y} \operatorname{sen}(y) \\&= -x \cos(y)\end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{yy}

$$\begin{aligned}f_{yy}(x, y) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial y} (e^x - x \operatorname{sen}(y)) \\&= \frac{\partial}{\partial y} (e^x) - \frac{\partial}{\partial y} (x \operatorname{sen}(y)) \\&= 0 - x \frac{\partial}{\partial y} \operatorname{sen}(y) \\&= -x \cos(y)\end{aligned}$$

(contínua no plano)

Exemplo 1 – f_{yx}

$$f_{yx}(x, y)$$

Exemplo 1 – f_{yx}

$$f_{yx}(x, y) = (f_y)_x(x, y)$$

Exemplo 1 – f_{yx}

$$\begin{aligned} f_{yx}(x, y) &= (f_y)_x(x, y) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{yx}

$$\begin{aligned} f_{yx}(x, y) &= (f_y)_x(x, y) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (e^x - x \operatorname{sen}(y)) \end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{yx}

$$\begin{aligned}f_{yx}(x, y) &= (f_y)_x(x, y) \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial x} (e^x - x \operatorname{sen}(y)) \\&= \frac{\partial}{\partial x} e^x - \frac{\partial}{\partial x} (x \operatorname{sen}(y))\end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{yx}

$$\begin{aligned}f_{yx}(x, y) &= (f_y)_x(x, y) \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial x} (e^x - x \operatorname{sen}(y)) \\&= \frac{\partial}{\partial x} e^x - \frac{\partial}{\partial x} (x \operatorname{sen}(y)) \\&= e^x - \operatorname{sen}(y) \frac{\partial x}{\partial x}\end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{yx}

$$\begin{aligned}f_{yx}(x, y) &= (f_y)_x(x, y) \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial x} (e^x - x \operatorname{sen}(y)) \\&= \frac{\partial}{\partial x} e^x - \frac{\partial}{\partial x} (x \operatorname{sen}(y)) \\&= e^x - \operatorname{sen}(y) \frac{\partial x}{\partial x} \\&= e^x - \operatorname{sen}(y)\end{aligned}$$

Exemplo 1 – f_{yx}

$$f_{yx}(x, y) = (f_y)_x(x, y)$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} (e^x - x \sin(y))$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} e^x - \frac{\partial}{\partial x} (x \sin(y))$$

$$= e^x - \sin(y) \frac{\partial x}{\partial x}$$

$$= e^x - \sin(y)$$

(contínua no plano)

Exemplo 1 – Resposta

$$f_x(x, y) = \cos(y) + ye^x$$

$$f_y(x, y) = e^x - x \operatorname{sen}(y)$$

Exemplo 1 – Resposta

$$f_{xx}(x, y) = ye^x$$

$$f_x(x, y) = \cos(y) + ye^x$$

$$f_{xy}(x, y) = e^x - \text{sen}(y)$$

$$f_y(x, y) = e^x - x \text{sen}(y)$$

$$f_{yy}(x, y) = -x \cos(y)$$

$$f_{yx}(x, y) = e^x - \text{sen}(y)$$

Exemplo 1 – Resposta

$$f_{xx}(x, y) = ye^x$$

$$f_x(x, y) = \cos(y) + ye^x$$

$$f_{xy}(x, y) = e^x - \text{sen}(y)$$

$$f_y(x, y) = e^x - x \text{sen}(y)$$

$$f_{yy}(x, y) = -x \cos(y)$$

$$f_{yx}(x, y) = e^x - \text{sen}(y)$$

Exemplo 2

Encontre as derivadas de segunda ordem mistas da função $f(x, y) = \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right)$

Exemplo 2

Encontre as derivadas de segunda ordem mistas da função $f(x, y) = \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right)$

Dica $\frac{d}{dt} \operatorname{arctg}(t) = \operatorname{arctg}'(t) = \frac{1}{1+t^2}$

Exemplo 2

Encontre as derivadas de segunda ordem mistas da função $f(x, y) = \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right)$

Dica $\frac{d}{dt} \operatorname{arctg}(t) = \operatorname{arctg}'(t) = \frac{1}{1+t^2}$

f não é contínua no plano

Exemplo 2

Encontre as derivadas de segunda ordem mistas da função $f(x, y) = \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right)$

Dica $\frac{d}{dt} \operatorname{arctg}(t) = \operatorname{arctg}'(t) = \frac{1}{1+t^2}$

f não é contínua no plano

Precisamos calcular f_{xy} e f_{yx}

Exemplo 2 – f_x

$$f_x(x, y)$$

Exemplo 2 – f_x

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}$$

Exemplo 2 – f_x

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\operatorname{arctg} \left(\frac{y}{x} \right) \right) \end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_x

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x} \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\operatorname{arctg} \left(\frac{y}{x} \right) \right) \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{x} \right)\end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_x

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x} \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\operatorname{arctg} \left(\frac{y}{x} \right) \right) \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{x} \right) \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) y \frac{\partial x^{-1}}{\partial x}\end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_x

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x} \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\operatorname{arctg} \left(\frac{y}{x} \right) \right) \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{x} \right) \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) y \frac{\partial x^{-1}}{\partial x} \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) y (-x^{-2})\end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_x

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x} \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\operatorname{arctg} \left(\frac{y}{x} \right) \right) \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{x} \right) \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) y \frac{\partial x^{-1}}{\partial x} \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) y (-x^{-2}) \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{-y}{x^2}\end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_x

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x} \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\operatorname{arctg} \left(\frac{y}{x} \right) \right) \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{x} \right) \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) y \frac{\partial x^{-1}}{\partial x} \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) y (-x^{-2}) \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{-y}{x^2}\end{aligned}$$

Lembrando que $\operatorname{arctg}'(t) = \frac{1}{1+t^2}$

Exemplo 2 – f_x

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x} \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\arctg \left(\frac{y}{x} \right) \right) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{x} \right) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) y \frac{\partial x^{-1}}{\partial x} \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) y (-x^{-2}) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{-y}{x^2}\end{aligned}$$

Lembrando que $\arctg'(t) = \frac{1}{1+t^2}$

$$f_x(x, y) = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \frac{-y}{x^2}$$

Exemplo 2 – f_x

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x} \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\arctg \left(\frac{y}{x} \right) \right) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{x} \right) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) y \frac{\partial x^{-1}}{\partial x} \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) y (-x^{-2}) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{-y}{x^2}\end{aligned}$$

Lembrando que $\arctg'(t) = \frac{1}{1+t^2}$

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x} \right)^2} \frac{-y}{x^2} \\&= \frac{1}{\frac{x^2 + y^2}{x^2}} \frac{-y}{x^2}\end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_x

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x} \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\arctg \left(\frac{y}{x} \right) \right) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{x} \right) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) y \frac{\partial x^{-1}}{\partial x} \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) y (-x^{-2}) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{-y}{x^2}\end{aligned}$$

Lembrando que $\arctg'(t) = \frac{1}{1+t^2}$

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x} \right)^2} \frac{-y}{x^2} \\&= \frac{1}{\frac{x^2 + y^2}{x^2}} \frac{-y}{x^2} \\&= \frac{x^2}{x^2 + y^2} \frac{-y}{x^2}\end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_x

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x} \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\arctg \left(\frac{y}{x} \right) \right) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{x} \right) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) y \frac{\partial x^{-1}}{\partial x} \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) y (-x^{-2}) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{-y}{x^2}\end{aligned}$$

Lembrando que $\arctg'(t) = \frac{1}{1+t^2}$

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x} \right)^2} \frac{-y}{x^2} \\&= \frac{1}{\frac{x^2 + y^2}{x^2}} \frac{-y}{x^2} \\&= \frac{x^2}{x^2 + y^2} \frac{-y}{x^2} \\&= \frac{-y}{x^2 + y^2}\end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_y

$$f_y(x, y)$$

Exemplo 2 – f_y

$$f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}$$

Exemplo 2 – f_y

$$\begin{aligned} f_y(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial y} \\ &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\operatorname{arctg} \left(\frac{y}{x} \right) \right) \end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_y

$$\begin{aligned}f_y(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial y} \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\operatorname{arctg} \left(\frac{y}{x} \right) \right) \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x} \right)\end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_y

$$\begin{aligned}f_y(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial y} \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\operatorname{arctg} \left(\frac{y}{x} \right) \right) \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x} \right) \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{1}{x} \frac{\partial y}{\partial y}\end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_y

$$\begin{aligned}f_y(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial y} \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\operatorname{arctg} \left(\frac{y}{x} \right) \right) \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x} \right) \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{1}{x} \frac{\partial y}{\partial y} \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{1}{x}\end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_y

$$\begin{aligned}f_y(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial y} \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\operatorname{arctg} \left(\frac{y}{x} \right) \right) \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x} \right) \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{1}{x} \frac{\partial y}{\partial y} \\&= \operatorname{arctg}' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{1}{x}\end{aligned}$$

Lembrando que $\operatorname{arctg}'(t) = \frac{1}{1+t^2}$

Exemplo 2 – f_y

$$\begin{aligned}f_y(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial y} \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\arctg \left(\frac{y}{x} \right) \right) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x} \right) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{1}{x} \frac{\partial y}{\partial y} \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{1}{x}\end{aligned}$$

Lembrando que $\arctg'(t) = \frac{1}{1+t^2}$

$$f_y(x, y) = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x} \right)^2} \frac{1}{x}$$

Exemplo 2 – f_y

$$\begin{aligned}f_y(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial y} \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\arctg \left(\frac{y}{x} \right) \right) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x} \right) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{1}{x} \frac{\partial y}{\partial y} \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{1}{x}\end{aligned}$$

Lembrando que $\arctg'(t) = \frac{1}{1+t^2}$

$$\begin{aligned}f_y(x, y) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x} \right)^2} \frac{1}{x} \\&= \frac{1}{\frac{x^2 + y^2}{x^2}} \frac{1}{x}\end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_y

$$\begin{aligned}f_y(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial y} \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\arctg \left(\frac{y}{x} \right) \right) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x} \right) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{1}{x} \frac{\partial y}{\partial y} \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{1}{x}\end{aligned}$$

Lembrando que $\arctg'(t) = \frac{1}{1+t^2}$

$$\begin{aligned}f_y(x, y) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x} \right)^2} \frac{1}{x} \\&= \frac{1}{\frac{x^2 + y^2}{x^2}} \frac{1}{x} \\&= \frac{x^2}{x^2 + y^2} \frac{1}{x}\end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_y

$$\begin{aligned}f_y(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial y} \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\arctg \left(\frac{y}{x} \right) \right) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x} \right) \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{1}{x} \frac{\partial y}{\partial y} \\&= \arctg' \left(\frac{y}{x} \right) \frac{1}{x}\end{aligned}$$

Lembrando que $\arctg'(t) = \frac{1}{1+t^2}$

$$\begin{aligned}f_y(x, y) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x} \right)^2} \frac{1}{x} \\&= \frac{1}{\frac{x^2 + y^2}{x^2}} \frac{1}{x} \\&= \frac{x^2}{x^2 + y^2} \frac{1}{x} \\&= \frac{x}{x^2 + y^2}\end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_{xy}

$$f_{xy}(x, y)$$

Exemplo 2 – f_{xy}

$$f_{xy}(x, y) = (f_x)_y(x, y)$$

Exemplo 2 – f_{xy}

$$\begin{aligned} f_{xy}(x, y) &= (f_x)_y(x, y) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_{xy}

$$\begin{aligned} f_{xy}(x, y) &= (f_x)_y(x, y) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) \end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_{xy}

$$\begin{aligned}f_{xy}(x, y) &= (f_x)_y(x, y) \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) \\&= - \frac{(x^2 + y^2) \frac{\partial y}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_{xy}

$$\begin{aligned}f_{xy}(x, y) &= (f_x)_y(x, y) \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) \\&= - \frac{(x^2 + y^2) \frac{\partial y}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

$$f_{xy}(x, y) = - \frac{x^2 + y^2 - y \left(\frac{\partial x^2}{\partial y} + \frac{\partial y^2}{\partial y} \right)}{(x^2 + y^2)^2}$$

Exemplo 2 – f_{xy}

$$\begin{aligned}f_{xy}(x, y) &= (f_x)_y(x, y) \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) \\&= - \frac{(x^2 + y^2) \frac{\partial y}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \\f_{xy}(x, y) &= - \frac{x^2 + y^2 - y \left(\frac{\partial x^2}{\partial y} + \frac{\partial y^2}{\partial y} \right)}{(x^2 + y^2)^2} \\&= - \frac{x^2 + y^2 - y(2y)}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_{xy}

$$\begin{aligned}f_{xy}(x, y) &= (f_x)_y(x, y) \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) \\&= - \frac{(x^2 + y^2) \frac{\partial y}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \\f_{xy}(x, y) &= - \frac{x^2 + y^2 - y \left(\frac{\partial x^2}{\partial y} + \frac{\partial y^2}{\partial y} \right)}{(x^2 + y^2)^2} \\&= - \frac{x^2 + y^2 - y(2y)}{(x^2 + y^2)^2} \\&= - \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_{xy}

$$\begin{aligned}f_{xy}(x, y) &= (f_x)_y(x, y) \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) \\&= - \frac{(x^2 + y^2) \frac{\partial y}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \\f_{xy}(x, y) &= - \frac{x^2 + y^2 - y \left(\frac{\partial x^2}{\partial y} + \frac{\partial y^2}{\partial y} \right)}{(x^2 + y^2)^2} \\&= - \frac{x^2 + y^2 - y(2y)}{(x^2 + y^2)^2} \\&= - \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \\&= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_{yx}

$$f_{yx}(x, y)$$

Exemplo 2 – f_{yx}

$$f_{yx}(x, y) = (f_y)_x(x, y)$$

Exemplo 2 – f_{yx}

$$\begin{aligned} f_{yx}(x, y) &= (f_y)_x(x, y) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_{yx}

$$\begin{aligned} f_{yx}(x, y) &= (f_y)_x(x, y) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) \end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_{yx}

$$\begin{aligned} f_{yx}(x, y) &= (f_y)_x(x, y) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) \\ &= \frac{(x^2 + y^2) \frac{\partial x}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_{yx}

$$\begin{aligned}f_{yx}(x, y) &= (f_y)_x(x, y) \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) \\&= \frac{(x^2 + y^2) \frac{\partial x}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

$$f_{yx}(x, y) = \frac{x^2 + y^2 - x \left(\frac{\partial x^2}{\partial x} + \frac{\partial y^2}{\partial x} \right)}{(x^2 + y^2)^2}$$

Exemplo 2 – f_{yx}

$$\begin{aligned}f_{yx}(x, y) &= (f_y)_x(x, y) \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) \\&= \frac{(x^2 + y^2) \frac{\partial x}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_{yx}(x, y) &= \frac{x^2 + y^2 - x \left(\frac{\partial x^2}{\partial x} + \frac{\partial y^2}{\partial x} \right)}{(x^2 + y^2)^2} \\&= \frac{x^2 + y^2 - x(2x)}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

Exemplo 2 – f_{yx}

$$\begin{aligned}f_{yx}(x, y) &= (f_y)_x(x, y) \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) \\&= \frac{(x^2 + y^2) \frac{\partial x}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_{yx}(x, y) &= \frac{x^2 + y^2 - x \left(\frac{\partial x^2}{\partial x} + \frac{\partial y^2}{\partial x} \right)}{(x^2 + y^2)^2} \\&= \frac{x^2 + y^2 - x(2x)}{(x^2 + y^2)^2} \\&= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

Exemplo 2 – Resposta

$$f_{xy}(x, y) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$f_{yx}(x, y) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

Conteúdo

Derivadas Parciais de Segunda Ordem

Teorema das Derivadas Mistas

Derivadas Parciais de Ordem Superior

Lista Mínima

Teorema das Derivadas Mistas

Se a função $f(x, y)$ e suas derivadas parciais f_x , f_y , f_{xy} e f_{yx}

Teorema das Derivadas Mistas

Se a função $f(x, y)$ e suas derivadas parciais f_x , f_y , f_{xy} e f_{yx} forem definidas em uma vizinhança do ponto (a, b)

Teorema das Derivadas Mistas

Se a função $f(x, y)$ e suas derivadas parciais f_x , f_y , f_{xy} e f_{yx} forem definidas em uma vizinhança do ponto (a, b) e todas forem contínuas, então

Teorema das Derivadas Mistas

Se a função $f(x, y)$ e suas derivadas parciais f_x , f_y , f_{xy} e f_{yx} forem definidas em uma vizinhança do ponto (a, b) e todas forem contínuas, então

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Exemplo 3

Encontre $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ se $w = xy + \frac{e^y}{y^2 + 1}$

Assumindo que as derivadas são contínuas

Exemplo 3 – solução

Queremos calcular

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)$$

Exemplo 3 – solução

Queremos calcular

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)$$

Calculando a primeira derivada

Exemplo 3 – solução

Queremos calcular

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)$$

Calculando a primeira derivada

$$\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(xy + \frac{e^y}{y^2 + 1} \right)$$

Exemplo 3 – solução

Queremos calcular

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)$$

Calculando a primeira derivada

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(xy + \frac{e^y}{y^2 + 1} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} (xy) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{e^y}{y^2 + 1} \right) \end{aligned}$$

Exemplo 3 – solução

Queremos calcular

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)$$

Calculando a primeira derivada

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(xy + \frac{e^y}{y^2 + 1} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} (xy) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{e^y}{y^2 + 1} \right) \end{aligned}$$

Precisamos calcular a derivada de uma divisão

Exemplo 3 – solução

Usando a hipótese de que as derivadas são **contínuas**

Exemplo 3 – solução

Usando a hipótese de que as derivadas são **contínuas**
podemos usar o teorema

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x}$$

Exemplo 3 – solução

Usando a hipótese de que as derivadas são **contínuas**
podemos usar o teorema

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x}$$

Temos então que calcular

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)$$

Exemplo 3 – solução

Calculando a derivada primeira

Exemplo 3 – solução

Calculando a derivada primeira

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(xy + \frac{e^y}{y^2 + 1} \right)$$

Exemplo 3 – solução

Calculando a derivada primeira

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(xy + \frac{e^y}{y^2 + 1} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (xy) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{e^y}{y^2 + 1} \right)\end{aligned}$$

Exemplo 3 – solução

Calculando a derivada primeira

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(xy + \frac{e^y}{y^2 + 1} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (xy) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{e^y}{y^2 + 1} \right) \\ &= y \frac{\partial x}{\partial x} + 0\end{aligned}$$

Exemplo 3 – solução

Calculando a derivada primeira

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(xy + \frac{e^y}{y^2 + 1} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (xy) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{e^y}{y^2 + 1} \right) \\ &= y \frac{\partial x}{\partial x} + 0 \\ &= y\end{aligned}$$

Exemplo 3 – solução

Calculando a derivada primeira

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(xy + \frac{e^y}{y^2 + 1} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (xy) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{e^y}{y^2 + 1} \right) \\ &= y \frac{\partial x}{\partial x} + 0 \\ &= y\end{aligned}$$

(contínua no plano)

Exemplo 3 – solução

Calculando a derivada segunda

Exemplo 3 – solução

Calculando a derivada segunda

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)$$

Exemplo 3 – solução

Calculando a derivada segunda

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} (y)\end{aligned}$$

Exemplo 3 – solução

Calculando a derivada segunda

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} (y) \\ &= 1\end{aligned}$$

Exemplo 3 – solução

Calculando a derivada segunda

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} (y) \\ &= 1\end{aligned}$$

(contínua no plano)

Conteúdo

Derivadas Parciais de Segunda Ordem

Teorema das Derivadas Mistas

Derivadas Parciais de Ordem Superior

Lista Mínima

Notações

Derivadas terceiras

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}$$

$$f_{xxx}$$

$$\frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2}$$

$$f_{xxy}$$

Derivadas quartas

$$\frac{\partial^4 f}{\partial x^4}$$

$$f_{xxxx}$$

$$\frac{\partial^4 f}{\partial y^2 \partial x^2}$$

$$f_{xxyy}$$

Ordem de Derivação

Desde que todas as derivadas envolvidas sejam contínuas

Ordem de Derivação

Desde que todas as derivadas envolvidas sejam contínuas
a ordem de derivação é irrelevante

Exemplo 4

Encontre a derivada $f_{yxyz}(x, y, z)$ da função $f(x, y, z) = 1 - 2xy^2z + x^2y$

Exemplo 4

Encontre a derivada $f_{yxyz}(x, y, z)$ da função $f(x, y, z) = 1 - 2xy^2z + x^2y$

Queremos calcular

$$f_{yxyz}(x, y, z) = \left(\left(\left(f_y(x, y, z) \right)_x \right)_y \right)_z = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \right) \right)$$

Exemplo 4 – solução

$$f(x, y, z) = 1 - 2xy^2z + x^2y$$

Exemplo 4 – solução

$$f(x, y, z) = 1 - 2xy^2z + x^2y$$

$$f_y(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y} (1 - 2xy^2z + x^2y)$$

Exemplo 4 – solução

$$f(x, y, z) = 1 - 2xy^2z + x^2y$$

$$f_y(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y} (1 - 2xy^2z + x^2y) = 0 - 2x2yz + x^2$$

Exemplo 4 – solução

$$f(x, y, z) = 1 - 2xy^2z + x^2y$$

$$f_y(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y} (1 - 2xy^2z + x^2y) = 0 - 2x2yz + x^2 = -4xyz + x^2$$

Exemplo 4 – solução

$$f(x, y, z) = 1 - 2xy^2z + x^2y$$

$$f_y(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y} (1 - 2xy^2z + x^2y) = 0 - 2x2yz + x^2 = -4xyz + x^2$$

$$f_{yx}(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x} (-4xyz + x^2)$$

Exemplo 4 – solução

$$f(x, y, z) = 1 - 2xy^2z + x^2y$$

$$f_y(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y} (1 - 2xy^2z + x^2y) = 0 - 2x2yz + x^2 = -4xyz + x^2$$

$$f_{yx}(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x} (-4xyz + x^2) = -4yz + 2x$$

Exemplo 4 – solução

$$f(x, y, z) = 1 - 2xy^2z + x^2y$$

$$f_y(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y} (1 - 2xy^2z + x^2y) = 0 - 2x2yz + x^2 = -4xyz + x^2$$

$$f_{yx}(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x} (-4xyz + x^2) = -4yz + 2x$$

$$f_{yxy}(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y} (-4yz + 2x)$$

Exemplo 4 – solução

$$f(x, y, z) = 1 - 2xy^2z + x^2y$$

$$f_y(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y} (1 - 2xy^2z + x^2y) = 0 - 2x2yz + x^2 = -4xyz + x^2$$

$$f_{yx}(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x} (-4xyz + x^2) = -4yz + 2x$$

$$f_{yxy}(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y} (-4yz + 2x) = -4z + 0$$

Exemplo 4 – solução

$$f(x, y, z) = 1 - 2xy^2z + x^2y$$

$$f_y(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y} (1 - 2xy^2z + x^2y) = 0 - 2x2yz + x^2 = -4xyz + x^2$$

$$f_{yx}(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x} (-4xyz + x^2) = -4yz + 2x$$

$$f_{yxy}(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y} (-4yz + 2x) = -4z + 0 = -4z$$

Exemplo 4 – solução

$$f(x, y, z) = 1 - 2xy^2z + x^2y$$

$$f_y(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y} (1 - 2xy^2z + x^2y) = 0 - 2x2yz + x^2 = -4xyz + x^2$$

$$f_{yx}(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x} (-4xyz + x^2) = -4yz + 2x$$

$$f_{yxy}(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y} (-4yz + 2x) = -4z + 0 = -4z$$

$$f_{yxyz}(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial z} (-4z)$$

Exemplo 4 – solução

$$f(x, y, z) = 1 - 2xy^2z + x^2y$$

$$f_y(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y} (1 - 2xy^2z + x^2y) = 0 - 2x2yz + x^2 = -4xyz + x^2$$

$$f_{yx}(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x} (-4xyz + x^2) = -4yz + 2x$$

$$f_{yxy}(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y} (-4yz + 2x) = -4z + 0 = -4z$$

$$f_{yxyz}(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial z} (-4z) = -4$$

Conteúdo

Derivadas Parciais de Segunda Ordem

Teorema das Derivadas Mistas

Derivadas Parciais de Ordem Superior

Lista Mínima

Lista Mínima

Cálculo Vol. 2 do Thomas 12^a ed. – Seção 14.3

1. Estudar o texto da seção
2. Resolver os exercícios: 43-45, 51-54, 57, 61

Atenção: A prova é baseada no livro, não nas apresentações