

Planos Tangentes

Luis Alberto D'Afonseca

Cálculo de Funções de Várias Variáveis – I



<https://material-didatico.github.io/pages/cfvv1>

Conteúdo

Plano Tangente à Superfície de Nível

Plano Tangente ao Gráfico de uma Função

Exemplos

Lista Mínima

Justificativa

Primeiro vamos verificar que o gradiente é normal a superfície de nível

Justificativa

Primeiro vamos verificar que o gradiente é normal a superfície de nível

Considere uma função $f(x, y, z)$ diferenciável e sua superfície de nível

$$f(x, y, z) = k$$

Justificativa

Primeiro vamos verificar que o gradiente é normal a superfície de nível

Considere uma função $f(x, y, z)$ diferenciável e sua superfície de nível

$$f(x, y, z) = k$$

Assuma que a curva paramétrica

$$\mathbf{r}(t) = u(t)\mathbf{i} + v(t)\mathbf{j} + w(t)\mathbf{k} = \begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \\ w(t) \end{pmatrix}$$

Justificativa

Primeiro vamos verificar que o gradiente é normal a superfície de nível

Considere uma função $f(x, y, z)$ diferenciável e sua superfície de nível

$$f(x, y, z) = k$$

Assuma que a curva paramétrica

$$\mathbf{r}(t) = u(t)\mathbf{i} + v(t)\mathbf{j} + w(t)\mathbf{k} = \begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \\ w(t) \end{pmatrix}$$

está contida na superfície de nível k da função f

$$f(u(t), v(t), w(t)) = k$$

Justificativa

$$f(u(t), v(t), w(t)) = k$$

$$\frac{d}{dt}f(u(t), v(t), w(t)) = \frac{dk}{dt}$$

Justificativa

$$f(u(t), v(t), w(t)) = k$$

$$\frac{d}{dt}f(u(t), v(t), w(t)) = \frac{dk}{dt}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{du}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dv}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dw}{dt} = 0$$

Justificativa

$$f(u(t), v(t), w(t)) = k$$

$$\frac{d}{dt}f(u(t), v(t), w(t)) = \frac{dk}{dt}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{du}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dv}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dw}{dt} = 0$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{du}{dt} \\ \frac{dv}{dt} \\ \frac{dw}{dt} \end{pmatrix} = 0$$

Justificativa

$$f(u(t), v(t), w(t)) = k$$

$$\frac{d}{dt}f(u(t), v(t), w(t)) = \frac{dk}{dt}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{du}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dv}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dw}{dt} = 0$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{du}{dt} \\ \frac{dv}{dt} \\ \frac{dw}{dt} \end{pmatrix} = 0$$

$$\nabla f \cdot \frac{dr}{dt} = 0$$

Se tomarmos todas as curvas suaves que passam por um ponto (a, b, c)

Se tomarmos todas as curvas suaves que passam por um ponto (a, b, c)

Seus vetores tangentes são todos ortogonais ao vetor gradiente no ponto

Se tomarmos todas as curvas suaves que passam por um ponto (a, b, c)

Seus vetores tangentes são todos ortogonais ao vetor gradiente no ponto

Todos os vetores tangentes estão no plano tangente a superfície

Definições

O Plano Tangente ao ponto (a, b, c)

Definições

O **Plano Tangente** ao ponto (a, b, c) na superfície de nível $f(x, y, z) = k$

Definições

O **Plano Tangente** ao ponto (a, b, c) na superfície de nível $f(x, y, z) = k$ de uma função diferenciável f

Definições

O **Plano Tangente** ao ponto (a, b, c) na superfície de nível $f(x, y, z) = k$ de uma função diferenciável f é o plano passando pelo ponto (a, b, c)

Definições

O **Plano Tangente** ao ponto (a, b, c) na superfície de nível $f(x, y, z) = k$ de uma função diferenciável f é o plano passando pelo ponto (a, b, c) e normal a $\nabla f(a, b, c)$

Definições

O **Plano Tangente** ao ponto (a, b, c) na superfície de nível $f(x, y, z) = k$ de uma função diferenciável f é o plano passando pelo ponto (a, b, c) e normal a $\nabla f(a, b, c)$

A **Reta Normal** da superfície no ponto é a reta passando pelo ponto

Definições

O **Plano Tangente** ao ponto (a, b, c) na superfície de nível $f(x, y, z) = k$ de uma função diferenciável f é o plano passando pelo ponto (a, b, c) e normal a $\nabla f(a, b, c)$

A **Reta Normal** da superfície no ponto é a reta passando pelo ponto na direção do gradiente $\nabla f(a, b, c)$

Equação do Plano Tangente

$$\nabla f(a, b, c) \cdot (X - X_0) = 0$$

Equação do Plano Tangente

$$\nabla f(a, b, c) \cdot (X - X_0) = 0$$

$$\nabla f(a, b, c) \cdot \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \\ z - c \end{pmatrix} = 0$$

Equação do Plano Tangente

$$\nabla f(a, b, c) \cdot (X - X_0) = 0$$

$$\nabla f(a, b, c) \cdot \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \\ z - c \end{pmatrix} = 0$$

$$f_x(a, b, c)(x - a) + f_y(a, b, c)(y - b) + f_z(a, b, c)(z - c) = 0$$

Equação da Reta Normal

$$X = X_0 + t \nabla f(a, b, c) \quad t \in \mathbb{R}$$

Equação da Reta Normal

$$X = X_0 + t \nabla f(a, b, c) \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} f_x(a, b, c) \\ f_y(a, b, c) \\ f_z(a, b, c) \end{pmatrix}$$

Equação da Reta Normal

$$X = X_0 + t \nabla f(a, b, c) \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} f_x(a, b, c) \\ f_y(a, b, c) \\ f_z(a, b, c) \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = a + t f_x(a, b, c) \\ y = b + t f_y(a, b, c) \\ z = c + t f_z(a, b, c) \end{cases}$$

Exemplo 1

Encontre o plano tangente e a reta normal da superfície

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 9 = 0$$

no ponto $(1, 2, 4)$

Exemplo 1 – Solução

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z - 9) = 2x$$

Exemplo 1 – Solução

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z - 9) = 2x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2 + z - 9) = 2y$$

Exemplo 1 – Solução

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z - 9) = 2x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2 + z - 9) = 2y$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} (x^2 + y^2 + z - 9) = 1$$

Exemplo 1 – Solução

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z - 9) = 2x \quad \nabla f$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2 + z - 9) = 2y$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} (x^2 + y^2 + z - 9) = 1$$

Exemplo 1 – Solução

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z - 9) = 2x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2 + z - 9) = 2y$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} (x^2 + y^2 + z - 9) = 1$$

$$\nabla f = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

Exemplo 1 – Solução

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z - 9) = 2x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2 + z - 9) = 2y$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} (x^2 + y^2 + z - 9) = 1$$

$$\nabla f = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 1 \end{pmatrix}$$

Exemplo 1 – Solução

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z - 9) = 2x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2 + z - 9) = 2y$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} (x^2 + y^2 + z - 9) = 1$$

$$\nabla f = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\nabla f(1, 2, 4)$$

Exemplo 1 – Solução

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z - 9) = 2x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2 + z - 9) = 2y$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} (x^2 + y^2 + z - 9) = 1$$

$$\nabla f = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\nabla f(1, 2, 4) = (2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k}) \Big|_{(1,2,4)}$$

Exemplo 1 – Solução

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z - 9) = 2x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2 + z - 9) = 2y$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} (x^2 + y^2 + z - 9) = 1$$

$$\nabla f = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \nabla f(1, 2, 4) &= (2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k}) \Big|_{(1,2,4)} \\ &= 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + \mathbf{k} \end{aligned}$$

Exemplo 1 – Solução

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z - 9) = 2x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2 + z - 9) = 2y$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} (x^2 + y^2 + z - 9) = 1$$

$$\nabla f = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \nabla f(1, 2, 4) &= (2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k}) \Big|_{(1,2,4)} \\ &= 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Exemplo 1 – Solução

Plano tangente

Exemplo 1 – Solução

Plano tangente

$$\nabla f(a, b, c) \cdot \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \\ z - c \end{pmatrix} = 0$$

Exemplo 1 – Solução

Plano tangente

$$\nabla f(a, b, c) \cdot \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \\ z - c \end{pmatrix} = 0$$

$$f_x(a, b, c)(x - a) + f_y(a, b, c)(y - b) + f_z(a, b, c)(z - c) = 0$$

Exemplo 1 – Solução

Plano tangente

$$\nabla f(a, b, c) \cdot \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \\ z - c \end{pmatrix} = 0$$

$$f_x(a, b, c)(x - a) + f_y(a, b, c)(y - b) + f_z(a, b, c)(z - c) = 0$$

$$f_x(1, 2, 4)(x - 1) + f_y(1, 2, 4)(y - 2) + f_z(1, 2, 4)(z - 4) = 0$$

Exemplo 1 – Solução

Plano tangente

$$\nabla f(a, b, c) \cdot \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \\ z - c \end{pmatrix} = 0$$

$$f_x(a, b, c)(x - a) + f_y(a, b, c)(y - b) + f_z(a, b, c)(z - c) = 0$$

$$f_x(1, 2, 4)(x - 1) + f_y(1, 2, 4)(y - 2) + f_z(1, 2, 4)(z - 4) = 0$$

$$2(x - 1) + 4(y - 2) + (z - 4) = 0$$

Exemplo 1 – Solução

Plano tangente

$$\nabla f(a, b, c) \cdot \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \\ z - c \end{pmatrix} = 0$$

$$f_x(a, b, c)(x - a) + f_y(a, b, c)(y - b) + f_z(a, b, c)(z - c) = 0$$

$$f_x(1, 2, 4)(x - 1) + f_y(1, 2, 4)(y - 2) + f_z(1, 2, 4)(z - 4) = 0$$

$$2(x - 1) + 4(y - 2) + (z - 4) = 0$$

$$2x + 4y + z = 14$$

Exemplo 1 – Solução

Reta normal

Exemplo 1 – Solução

Reta normal

$$X = X_0 + t \nabla f(a, b, c) \quad t \in \mathbb{R}$$

Exemplo 1 – Solução

Reta normal

$$X = X_0 + t \nabla f(a, b, c) \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} x = a + t f_x(a, b, c) \\ y = b + t f_y(a, b, c) \\ z = c + t f_z(a, b, c) \end{cases}$$

Exemplo 1 – Solução

Reta normal

$$X = X_0 + t \nabla f(a, b, c) \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} x = a + t f_x(a, b, c) \\ y = b + t f_y(a, b, c) \\ z = c + t f_z(a, b, c) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 4t \\ z = 4 + t \end{cases}$$

Conteúdo

Plano Tangente à Superfície de Nível

Plano Tangente ao Gráfico de uma Função

Exemplos

Lista Mínima

Justificativa

Queremos o Plano Tangente a superfície suave $z = g(x, y)$
em um ponto (a, b, c) onde $c = g(a, b)$

Justificativa

Queremos o Plano Tangente a superfície suave $z = g(x, y)$
em um ponto (a, b, c) onde $c = g(a, b)$

Podemos escrever $z = g(x, y)$ como $g(x, y) - z = 0$

Justificativa

Queremos o Plano Tangente a superfície suave $z = g(x, y)$ em um ponto (a, b, c) onde $c = g(a, b)$

Podemos escrever $z = g(x, y)$ como $g(x, y) - z = 0$

Queremos o plano tangente a curva de nível zero da função

$$f(x, y, z) = g(x, y) - z = 0$$

Derivadas de F

$$f_x(x, y, z)$$

Derivadas de F

$$f_x(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x} (g(x, y) - z)$$

Derivadas de F

$$f_x(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x} (g(x, y) - z) = g_x(x, y) - 0$$

Derivadas de F

$$f_x(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x}(g(x, y) - z) = g_x(x, y) - 0 = g_x(x, y)$$

Derivadas de F

$$f_x(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x}(g(x, y) - z) = g_x(x, y) - 0 = g_x(x, y)$$

$$f_y(x, y, z)$$

Derivadas de F

$$f_x(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x}(g(x, y) - z) = g_x(x, y) - 0 = g_x(x, y)$$

$$f_y(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y}(g(x, y) - z)$$

Derivadas de F

$$f_x(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x}(g(x, y) - z) = g_x(x, y) - 0 = g_x(x, y)$$

$$f_y(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y}(g(x, y) - z) = g_y(x, y) - 0$$

Derivadas de F

$$f_x(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x}(g(x, y) - z) = g_x(x, y) - 0 = g_x(x, y)$$

$$f_y(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y}(g(x, y) - z) = g_y(x, y) - 0 = g_y(x, y)$$

Derivadas de F

$$f_x(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x}(g(x, y) - z) = g_x(x, y) - 0 = g_x(x, y)$$

$$f_y(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y}(g(x, y) - z) = g_y(x, y) - 0 = g_y(x, y)$$

$$f_z(x, y, z)$$

Derivadas de F

$$f_x(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x}(g(x, y) - z) = g_x(x, y) - 0 = g_x(x, y)$$

$$f_y(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y}(g(x, y) - z) = g_y(x, y) - 0 = g_y(x, y)$$

$$f_z(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial z}(g(x, y) - z)$$

Derivadas de F

$$f_x(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x}(g(x, y) - z) = g_x(x, y) - 0 = g_x(x, y)$$

$$f_y(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y}(g(x, y) - z) = g_y(x, y) - 0 = g_y(x, y)$$

$$f_z(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial z}(g(x, y) - z) = 0 - 1$$

Derivadas de F

$$f_x(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x}(g(x, y) - z) = g_x(x, y) - 0 = g_x(x, y)$$

$$f_y(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y}(g(x, y) - z) = g_y(x, y) - 0 = g_y(x, y)$$

$$f_z(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial z}(g(x, y) - z) = 0 - 1 = -1$$

Equação do Plano Tangente ao gráfico da função $f(x, y)$

$$\nabla f(a, b, c) \cdot \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \\ z - c \end{pmatrix} = 0$$

Equação do Plano Tangente ao gráfico da função $f(x, y)$

$$\nabla f(a, b, c) \cdot \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \\ z - c \end{pmatrix} = 0$$

$$f_x(a, b, c)(x - a) + f_y(a, b, c)(y - b) + f_z(a, b, c)(z - c) = 0$$

Justificativa

Equação do Plano Tangente ao gráfico da função $f(x, y)$

$$\nabla f(a, b, c) \cdot \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \\ z - c \end{pmatrix} = 0$$

$$f_x(a, b, c)(x - a) + f_y(a, b, c)(y - b) + f_z(a, b, c)(z - c) = 0$$

$$g_x(a, b)(x - a) + g_y(a, b)(y - b) - (z - c) = 0$$

Plano Tangente a superfície $z = f(x, y)$

O plano tangente ao gráfico de $f(x, y)$,

Plano Tangente a superfície $z = f(x, y)$

O plano tangente ao gráfico de $f(x, y)$, isto é, à superfície $z = f(x, y)$

Plano Tangente a superfície $z = f(x, y)$

O plano tangente ao gráfico de $f(x, y)$, isto é, à superfície $z = f(x, y)$ de uma função diferenciável f

Plano Tangente a superfície $z = f(x, y)$

O plano tangente ao gráfico de $f(x, y)$, isto é, à superfície $z = f(x, y)$ de uma função diferenciável f no ponto (a, b) é

Plano Tangente a superfície $z = f(x, y)$

O plano tangente ao gráfico de $f(x, y)$, isto é, à superfície $z = f(x, y)$ de uma função diferenciável f no ponto (a, b) é

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) (x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) (y - b) - (z - f(a, b)) = 0$$

Conteúdo

Plano Tangente à Superfície de Nível

Plano Tangente ao Gráfico de uma Função

Exemplos

Lista Mínima

Exemplo 2

Encontre o plano tangente ao gráfico da função

$$f(x, y) = x \cos(y) - ye^x$$

no ponto $(0, 0)$

Exemplo 2 – Avaliando o valor da função no ponto

Exemplo 2 – Avaliando o valor da função no ponto

c

Exemplo 2 – Avaliando o valor da função no ponto

$$c = f(0, 0)$$

Exemplo 2 – Avaliando o valor da função no ponto

$$c = f(0, 0) = (x \cos(y) - ye^x) \Big|_{(0,0)}$$

Exemplo 2 – Avaliando o valor da função no ponto

$$c = f(0, 0) = (x \cos(y) - ye^x) \Big|_{(0,0)} = 0 \times \cos(0) - 0 \times e^0$$

Exemplo 2 – Avaliando o valor da função no ponto

$$c = f(0, 0) = (x \cos(y) - ye^x) \Big|_{(0,0)} = 0 \times \cos(0) - 0 \times e^0 = 0$$

Exemplo 2 – Derivadas parciais de $f(x, y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$$

Exemplo 2 – Derivadas parciais de $f(x, y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y) - ye^x)$$

Exemplo 2 – Derivadas parciais de $f(x, y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y) - ye^x) = \cos(y) - ye^x$$

Exemplo 2 – Derivadas parciais de $f(x, y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y) - ye^x) = \cos(y) - ye^x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$$

Exemplo 2 – Derivadas parciais de $f(x, y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y) - ye^x) = \cos(y) - ye^x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (x \cos(y) - ye^x)$$

Exemplo 2 – Derivadas parciais de $f(x, y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y) - ye^x) = \cos(y) - ye^x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (x \cos(y) - ye^x) = -x \sin(y) - e^x$$

Exemplo 2 – Derivadas parciais de $f(x, y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y) - ye^x) = \cos(y) - ye^x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (x \cos(y) - ye^x) = -x \sin(y) - e^x$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$$

Exemplo 2 – Derivadas parciais de $f(x, y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y) - ye^x) = \cos(y) - ye^x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (x \cos(y) - ye^x) = -x \sin(y) - e^x$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = (\cos(y) - ye^x) \Big|_{(0,0)}$$

Exemplo 2 – Derivadas parciais de $f(x, y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y) - ye^x) = \cos(y) - ye^x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (x \cos(y) - ye^x) = -x \operatorname{sen}(y) - e^x$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = (\cos(y) - ye^x) \Big|_{(0,0)} = 1$$

Exemplo 2 – Derivadas parciais de $f(x, y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y) - ye^x) = \cos(y) - ye^x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (x \cos(y) - ye^x) = -x \sin(y) - e^x$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = (\cos(y) - ye^x) \Big|_{(0,0)} = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$$

Exemplo 2 – Derivadas parciais de $f(x, y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y) - ye^x) = \cos(y) - ye^x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (x \cos(y) - ye^x) = -x \operatorname{sen}(y) - e^x$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = (\cos(y) - ye^x) \Big|_{(0,0)} = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = (-x \operatorname{sen}(y) - e^x) \Big|_{(0,0)}$$

Exemplo 2 – Derivadas parciais de $f(x, y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x \cos(y) - ye^x) = \cos(y) - ye^x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (x \cos(y) - ye^x) = -x \operatorname{sen}(y) - e^x$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = (\cos(y) - ye^x) \Big|_{(0,0)} = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = (-x \operatorname{sen}(y) - e^x) \Big|_{(0,0)} = -1$$

Exemplo 2 – Solução

Plano tangente

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0$$

Exemplo 2 – Solução

Plano tangente

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0$$

$$f_x(0, 0)(x - 0) + f_y(0, 0)(y - 0) - (z - f(0, 0)) = 0$$

Exemplo 2 – Solução

Plano tangente

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0$$

$$f_x(0, 0)(x - 0) + f_y(0, 0)(y - 0) - (z - f(0, 0)) = 0$$

$$1(x - 0) - 1(y - 0) - (z - 0) = 0$$

Exemplo 2 – Solução

Plano tangente

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0$$

$$f_x(0, 0)(x - 0) + f_y(0, 0)(y - 0) - (z - f(0, 0)) = 0$$

$$1(x - 0) - 1(y - 0) - (z - 0) = 0$$

$$x - y - z = 0$$

Exemplo 3

Encontre o plano tangente ao gráfico da função

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y + 4$$

no ponto $(2, -3)$

Exemplo 3 – Solução

A equação do plano tangente ao gráfico da função f no ponto $(2, -3)$ é

Exemplo 3 – Solução

A equação do plano tangente ao gráfico da função f no ponto $(2, -3)$ é

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(x, y)) = 0$$

Exemplo 3 – Solução

A equação do plano tangente ao gráfico da função f no ponto $(2, -3)$ é

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(x, y)) = 0$$

$$f_x(2, -3)(x - 2) + f_y(2, -3)(y + 3) - (z - f(2, -3)) = 0$$

Exemplo 3 – Calculando a derivada parcial em x

$$f_x(x, y)$$

Exemplo 3 – Calculando a derivada parcial em x

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$$

Exemplo 3 – Calculando a derivada parcial em x

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y + 4)$$

Exemplo 3 – Calculando a derivada parcial em x

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y + 4) = 2x - 2y - 1$$

Exemplo 3 – Calculando a derivada parcial em x

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y + 4) = 2x - 2y - 1$$

$$f_x(2, -3)$$

Exemplo 3 – Calculando a derivada parcial em x

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y + 4) = 2x - 2y - 1$$

$$f_x(2, -3) = (2x - 2y - 1) \Big|_{(2, -3)}$$

Exemplo 3 – Calculando a derivada parcial em x

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y + 4) = 2x - 2y - 1$$

$$f_x(2, -3) = (2x - 2y - 1) \Big|_{(2, -3)} = 2(2) - 2(-3) - 1$$

Exemplo 3 – Calculando a derivada parcial em x

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y + 4) = 2x - 2y - 1$$

$$f_x(2, -3) = (2x - 2y - 1) \Big|_{(2, -3)} = 2(2) - 2(-3) - 1 = 4 + 6 - 1$$

Exemplo 3 – Calculando a derivada parcial em x

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y + 4) = 2x - 2y - 1$$

$$f_x(2, -3) = (2x - 2y - 1) \Big|_{(2, -3)} = 2(2) - 2(-3) - 1 = 4 + 6 - 1 = 9$$

Exemplo 3 – Calculando a derivada parcial em y

$$f_y(x, y)$$

Exemplo 3 – Calculando a derivada parcial em y

$$f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$$

Exemplo 3 – Calculando a derivada parcial em y

$$f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y + 4)$$

Exemplo 3 – Calculando a derivada parcial em y

$$f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y + 4) = 2y - 2x + 3$$

Exemplo 3 – Calculando a derivada parcial em y

$$f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y + 4) = 2y - 2x + 3$$

$$f_y(2, -3)$$

Exemplo 3 – Calculando a derivada parcial em y

$$f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y + 4) = 2y - 2x + 3$$

$$f_y(2, -3) = (2y - 2x + 3) \Big|_{(2, -3)}$$

Exemplo 3 – Calculando a derivada parcial em y

$$f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y + 4) = 2y - 2x + 3$$

$$f_y(2, -3) = (2y - 2x + 3) \Big|_{(2, -3)} = 2(-3) - 2(2) + 3$$

Exemplo 3 – Calculando a derivada parcial em y

$$f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y + 4) = 2y - 2x + 3$$

$$f_y(2, -3) = (2y - 2x + 3) \Big|_{(2, -3)} = 2(-3) - 2(2) + 3 = -6 - 4 + 3$$

Exemplo 3 – Calculando a derivada parcial em y

$$f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y + 4) = 2y - 2x + 3$$

$$f_y(2, -3) = (2y - 2x + 3) \Big|_{(2, -3)} = 2(-3) - 2(2) + 3 = -6 - 4 + 3 = -7$$

Exemplo 3 – Avaliando f no ponto $(2, -3)$

$$f(2, -3)$$

Exemplo 3 – Avaliando f no ponto $(2, -3)$

$$f(2, -3) = (x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y + 4) \Big|_{(2, -3)}$$

Exemplo 3 – Avaliando f no ponto $(2, -3)$

$$\begin{aligned} f(2, -3) &= (x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y + 4) \Big|_{(2, -3)} \\ &= 2^2 + (-3)^2 - 2(2)(-3) - 2 + 3(-3) + 4 \end{aligned}$$

Exemplo 3 – Avaliando f no ponto $(2, -3)$

$$\begin{aligned} f(2, -3) &= (x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y + 4) \Big|_{(2, -3)} \\ &= 2^2 + (-3)^2 - 2(2)(-3) - 2 + 3(-3) + 4 \\ &= 4 + 9 + 12 - 2 - 9 + 4 \end{aligned}$$

Exemplo 3 – Avaliando f no ponto $(2, -3)$

$$\begin{aligned} f(2, -3) &= (x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y + 4) \Big|_{(2, -3)} \\ &= 2^2 + (-3)^2 - 2(2)(-3) - 2 + 3(-3) + 4 \\ &= 4 + 9 + 12 - 2 - 9 + 4 \\ &= 18 \end{aligned}$$

Exemplo 3 – Equação do Plano Tangente

$$f_x(2, -3)(x - 2) + f_y(2, -3)(y + 3) - (z - f(2, -3)) = 0$$

Exemplo 3 – Equação do Plano Tangente

$$f_x(2, -3)(x - 2) + f_y(2, -3)(y + 3) - (z - f(2, -3)) = 0$$

$$9(x - 2) - 7(y + 3) - (z - 18) = 0$$

Exemplo 3 – Equação do Plano Tangente

$$f_x(2, -3)(x - 2) + f_y(2, -3)(y + 3) - (z - f(2, -3)) = 0$$

$$9(x - 2) - 7(y + 3) - (z - 18) = 0$$

$$9x - 18 - 7y - 21 - z + 18 = 0$$

Exemplo 3 – Equação do Plano Tangente

$$f_x(2, -3)(x - 2) + f_y(2, -3)(y + 3) - (z - f(2, -3)) = 0$$

$$9(x - 2) - 7(y + 3) - (z - 18) = 0$$

$$9x - 18 - 7y - 21 - z + 18 = 0$$

$$9x - 7y - z = 21$$

Conteúdo

Plano Tangente à Superfície de Nível

Plano Tangente ao Gráfico de uma Função

Exemplos

Lista Mínima

Lista Mínima

Cálculo Vol. 2 do Thomas 12^a ed. – Seção 14.6

1. Estudar o texto da seção
2. Resolver os exercícios: 1-8

Atenção: A prova é baseada no livro, não nas apresentações