Volumes de Sóidos de Revolução

Luis Alberto D'Afonseca

Integração e Séries

 $17 ext{ de agosto de } 2025$

Conteúdo

Sólidos de Revolução

Exemplos

Exemplo 1

Exemplo 2

Exemplo 3

Exemplo 4

Exemplo 5

Lista Mínima

Sólidos de Revolução

Sólido de revolução é obtido pela rotação de uma região plana em torno de um eixo.


Seção transversal será um disco de raio R(x)

$$A(x) = \pi R(x)^2$$

Anel circular de raio externo R(x) e raio interno r(x)

$$A(x) = \pi \left(R(x)^2 - r(x)^2 \right)$$

Sólidos de Revolução



Conteúdo

Sólidos de Revolução

Exemplos

Exemplo 1

Exemplo 2


Exemplo 3

Exemplo 4

Exemplo 5

Lista Mínima

Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região sob a curva $f(x)=\sqrt{x}$ de 0 até 1



Exemplo 1 – Área da seção transversal

A seção transversal é um círculo de raio

$$R(x) = \sqrt{x}$$


com área


$$A(x) = \pi R(x)^2 = \pi \left(\sqrt{x}\right)^2 = \pi x$$

Exemplo 1 – Volume

$$V = \int_0^1 \pi x \, dx = \pi \left(\frac{x^2}{2}\right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região limitada por $y=x^3$, y=8, e x=0 em torno do eixo y





Exemplo 3 – Área da seção transversal

Seção transversal é um círculo de raio \boldsymbol{x}

$$x = \sqrt[3]{y}$$

Área da seção transversal

$$A(y) = \pi R(y)^2 = \pi (\sqrt[3]{y})^2 = \pi y^{2/3}$$

Exemplo 2 – Volume


$$V = \int_0^8 \pi y^{2/3} dy = \pi \left(\frac{3}{5} y^{5/3}\right) \Big|_0^8 = \pi \frac{3}{5} 8^{5/3} = \frac{96\pi}{5}$$

A região \mathcal{R} , limitada pelas curvas delimitada pelas curvas

$$y = x$$
 e $y = x^2$

é girada em torno do eixo x.

Encontre o volume do sólido resultante.



Exemplo 5 – Área da seção transversal

As curvas y = x e $y = x^2$ se intersectam nos pontos (0,0) e (1,1)

A seção transversal é um anel

Raio interno

$$r(x) = x^2$$

Raio externo

$$R(x) = x$$


Área da seção transversal

$$A(x) = \pi \left(x^2 - (x^2)^2\right) = \pi \left(x^2 - x^4\right)$$

Exemplo 3 – Volume

$$V = \int_0^1 \pi(x^2 - x^4) dx = \pi \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}\right) \Big|_0^1 = \pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) = \frac{2\pi}{15}$$

Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região do exemplo anterior em torno da reta x=-1



Exemplo 4 – Área da seção transversal

A seção transversal é um anel

Raio interno

$$r(y) = 1 + y$$

Raio externo

$$R(y) = 1 + \sqrt{y}$$

Área da seção transversal

$$A(y) = \pi \left(R(y)^2 - r(y)^2 \right)$$

$$= \pi \left[(1 + \sqrt{y})^2 - (1 + y)^2 \right]$$

$$= \pi \left[(1 + 2\sqrt{y} + y) - (1 + 2y + y^2) \right]$$

$$= \pi \left(2\sqrt{y} - y - y^2 \right)$$

Exemplo 4 – Volume

$$V = \int_0^1 A(y) \, dy$$


$$= \int_0^1 \pi \left(2\sqrt{y} - y - y^2 \right) \, dy$$

$$= \pi \left(\frac{4y^{3/2}}{3} - \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right) \Big|_0^1$$

$$= \pi \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right)$$

$$= \frac{\pi}{2}$$

Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região do exemplo anterior em torno da reta y=2



Exemplo 5 – Área da seção transversal

A seção transversal é um anel

Raio interno

$$r(x) = 2 - x$$

Raio externo

$$R(x) = 2 - x^2$$

Área

$$A(x) = \pi (2 - x^{2})^{2} - \pi (2 - x)^{2} = \pi (x^{4} - 5x^{2} + 4x)$$

Exemplo 5 – Volume

$$V = \int_0^1 A(x) dx$$

$$= \int_0^1 \pi \left(x^4 - 5x^2 + 4x \right) dx$$

$$= \pi \left(\frac{x^5}{5} - 5\frac{x^3}{3} + 4\frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^1$$

$$= \pi \left(\frac{1}{5} - \frac{5}{3} + \frac{4}{2} \right)$$

$$= \frac{8\pi}{15}$$

Conteúdo

Sólidos de Revolução

Exemplos

Exemplo 1

Exemplo 2

Exemplo 3

Exemplo 4

Exemplo 5

Lista Mínima

Lista Mínima

Estudar a Seção 3.3 da Apostila

Exercícios: 1a-f, 2, 3

Atenção: A prova é baseada no livro, não nas apresentações