Séries Numéricas – Teste da Integral

Luis Alberto D'Afonseca

Integração e Séries

17 de agosto de 2025

Conteúdo

Recapitulando

Série com Termos Não-Negativos

Teste da Integral

Estimativa de Erro

Exemplos

Lista Mínima

Recapitulando

Sequências numéricas

$$\left(a_{k}\right)_{k=1}^{\infty} \qquad \qquad a_{1}, a_{2}, a_{3}, \ldots$$

Séries numéricas

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_k + \cdots$$

Somas parciais

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

Conteúdo

Recapitulando

Série com Termos Não-Negativos

Teste da Integral

Estimativa de Erro

Exemplos

Lista Mínima

Série com Termos Não-Negativos

Caso particular de séries onde $a_n \ge 0 \quad \forall n$

Uma série

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \qquad \text{com} \qquad a_n \ge 0$$

é convergente se, e somente se, sua sequência de somas parciais, S_n , é uma sequência limitada superiormente.

Conteúdo

Recapitulando

Série com Termos Não-Negativos

Teste da Integral

Estimativa de Erro

Exemplos

Lista Mínima

Teste da Integral


➤ Trocamos o problema de verificar se uma série converge para o de verificar se uma integral converge

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge?} \quad \text{por} \quad \int_1^{\infty} f(x) \, dx \text{ converge?}$$

O valor da integral **não é** uma boa aproximação para a soma da série

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \not\approx \quad \int_1^{\infty} f(x) \, dx$$

Diferença Entre a Integral e a Série




Teste da Integral

Seja (a_n) uma sequência tal que

- 1. seus termos são positivos, $a_n > 0$
- 2. $a_n = f(n)$
- 3. f é contínua, positiva e decrescente para todo $x \geq N$

Então, a série
$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n$$
 converge se, e somente se, a integral $\int_{N}^{\infty} f(x) dx$ converge


Ilustração do Teste da Integral – 1



A série é "maior" do que a integral

$$\int_{N}^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{n=N}^{\infty} a_{n}$$

Ilustração do Teste da Integral – 2



A série é "menor" do que a integral

$$\sum_{N=1}^{\infty} a_k \leq a_N + \int_{N}^{\infty} f(x) \, dx$$

Comparação entre a Série e a Integral

Temos portanto as relações

$$\int_{N}^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{k=N}^{\infty} a_{k} \leq a_{N} + \int_{N}^{\infty} f(x) dx$$

Lembrando como Calcular uma Integral Imprópria

$$\int_{a}^{\infty} f(x) dx = \lim_{b \to \infty} \int_{a}^{b} f(x) dx = \lim_{b \to \infty} \left(F(x) \Big|_{a}^{b} \right) = \lim_{b \to \infty} \left(F(b) - F(a) \right)$$

Série p

Série p ou p-série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \frac{1}{5^p} + \cdots$$

onde p é uma constante real

Não confundir com a série geométrica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha r^n = \alpha + \alpha r + \alpha r^2 + \alpha r^3 + \alpha r^4 + \cdots$$

Série Harmônica (p = 1)

Série Harmônica é um caso particular da série p com p=1

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots$$

Essa série passa no teste da divergência pois $a_n = \frac{1}{n} \to 0$ mas mesmo assim diverge

Somas Parciais da Série Harmônica

$$S_{2} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$S_{4} = S_{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > S_{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = \frac{4}{2}$$

$$S_{8} = S_{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} > S_{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} > \frac{4}{2} + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$S_{16} = S_{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16} > S_{8} + \frac{8}{16} > \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = \frac{6}{2}$$

Somas Parciais da Série Harmônica

Considerando os termos $n=2^k$ da sequência de somas parciais observamos que

$$S_{2^k} \geq \frac{2+k}{2}$$

portanto $S_n \to \infty$ e a série harmônica diverge

Aplicando o Teste da Integral para $p \neq 1$

Observamos que

$$a_n = \frac{1}{n^p} = f(n)$$
 para $f(x) = \frac{1}{x^p}$

Para $x \in [1, \infty)$ a função f(x) é descrescente, contínua e positiva, pelo Teste da Integral, temos

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad \text{converge} \qquad \Leftrightarrow \qquad \int_{1}^{\infty} \frac{1}{x^p} \, dx \quad \text{converge}$$

Calculando a Integral

$$\int_{1}^{\infty} \frac{1}{x^{p}} dx = \lim_{b \to \infty} \int_{1}^{b} x^{-p} dx$$

$$= \lim_{b \to \infty} \left[\left. \frac{x^{1-p}}{1-p} \right|_{1}^{b} \right. \right]$$

$$= \frac{1}{1-p} \lim_{b \to \infty} \left(b^{1-p} - 1 \right)$$

A convergência de $\lim_{b \to \infty} b^{1-p}$ depende do valor de p

Convergência

Se
$$p > 1$$

$$1 - p < 0$$

$$\lim_{b\to\infty}b^{1-p}=0$$

Se
$$p < 1$$

$$1 - p > 0$$

$$\lim_{b\to\infty} b^{1-p}$$
 diverge

Convergência da Série p

A série-p

$$\sum_{p=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \frac{1}{5^p} + \frac{1}{6^p} + \cdots$$

converge para p>1 e diverge caso contrário

Use o teste da integral para determinar se a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

converge ou diverge

Certifique-se de que as condições do teste da integral sejam satisfeitas

Podemos aplicar o teste da integral pois a função $f(x) = \frac{1}{x^2}$

é positiva, contínua e decrescente para $x \geq 1$

$$\int_{1}^{\infty} \frac{1}{x^{2}} dx = \lim_{b \to \infty} \int_{1}^{b} \frac{1}{x^{2}} dx$$

$$= \lim_{b \to \infty} \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_{1}^{b}$$

$$= \lim_{b \to \infty} \left(-\frac{1}{b} + 1 \right) = 1$$

Como a integral converge a série também converge

Note que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \approx 1,6449 \neq 1$$

O cálculo da soma da série está na Seção 9.6 – Problema de Basileia

Conteúdo

Recapitulando

Série com Termos Não-Negativos

Teste da Integral

Estimativa de Erro

Exemplos

Lista Mínima

Convergência da Série *p*

Não temos uma fórmula para a soma da série

Podemos usar as somas parciais para aproximar a soma

Quantos termos precisamos?

Resto ou Erro

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

$$= \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$$

$$= S_n + R_n$$

 R_n é o resto da série, isso é, o que faltou ser calculado

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$$

Estimativa de Erro

Se uma série é convergente pelo teste da integral podemos estimar o resto

$$R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + a_{n+4} + \cdots$$

comparando a área dos retângulos com a da integral temos

$$R_n \ge \int_{n+1}^{\infty} f(x) \, dx$$

$$R_n \le \int_n^\infty f(x) \ dx$$

Limitantes para o resto no teste da integral

Se a série
$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

converge segundo o teste da integral, então o resto satisfaz

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq R_n \leq \int_{n}^{\infty} f(x) dx$$

Conteúdo

Recapitulando

Série com Termos Não-Negativos

Teste da Integral

Estimativa de Erro

Exemplos

Lista Mínima

Use o teste da integral para determinar se a série converge ou diverge. Certifique-se de que as condições do teste da integral sejam satisfeitas.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 4}$$

A função
$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$$
 é positiva e contínua para $x \ge 1$

Para verificar que ela é decrescente, calculamos sua derivada

$$f'(x) = \frac{1(x^2+4) - x(2x)}{(x^2+4)^2} = \frac{4-x^2}{(x^2+4)^2}$$

$$f'(x) < 0$$
, e portanto f é decrescente, para todo $x > 2$

Precisamos de um N inteiro a partir do qual f seja decrescente

Escolhemos N = 3

Podemos, agora, aplicar o teste da integral

Primeiro calculamos a primitiva de $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$ usando substituição

$$u = x^{2} + 4 e du = 2xdx$$

$$F(x) = \int \frac{x}{x^{2} + 4} dx = \int \frac{1}{2u} du$$

$$=\frac{1}{2}\ln u+C$$

$$=\frac{1}{2}\ln\left(x^2+4\right)+C$$

Calculando a integral imprópria temos

$$\int_{3}^{\infty} \frac{x}{x^{2} + 4} dx = \lim_{b \to \infty} \int_{3}^{b} \frac{x}{x^{2} + 4} dx$$

$$= \lim_{b \to \infty} \left[F(x) \right] \Big|_{3}^{b}$$

$$= \lim_{b \to \infty} \left[\frac{1}{2} \ln \left(x^{2} + 4 \right) \right] \Big|_{3}^{b}$$

$$= \lim_{b \to \infty} \left[\frac{\ln \left(b^{2} + 4 \right) - \ln \left(3^{2} + 4 \right)}{2} \right] = \infty$$

Como a integral diverge a série também diverge

Sabemos que a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

converge, pois é uma série p, com p=2

Descubra n tal que o resto R_n da aproximação S_n seja menor que 0,01

Sabemos que o Teste da Integral pode ser aplicado, pois

$$\int_{n}^{\infty} \frac{dx}{x^{2}} = \lim_{b \to \infty} \left[-\frac{1}{b} + \frac{1}{n} \right] = \frac{1}{n}$$

Assim

$$\frac{1}{n+1} \leq R_n \leq \frac{1}{n}$$

Para garantir que $R_n < 0.01$ impomos que

$$\frac{1}{n} < 0.01$$

isolando n obtemos n > 100

A aproximação S_{100} tem um erro menor do que $0,\!01$

Conteúdo

Recapitulando

Série com Termos Não-Negativos

Teste da Integral

Estimativa de Erro

Exemplos

Lista Mínima

Lista Mínima

Estudar as Seção 6.4 da Apostila

Exercícios: 3, 7a, 8, 9, 10

Atenção: A prova é baseada no livro, não nas apresentações